

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν τη χρήση. Προσθέστε την ποσότητα σκευάσματος που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε και αναδευάστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. Για να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα, το pH του ψεκαστικού υγρού πρέπει να κυμαίνεται από 4-8.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΤΟΜΑΤΑ (Υπαιθρου & Θερμοκηπίου) για *Tuta absoluta*. Δόση 120-230 κ.εκ./δεκ. ή 146,3-575 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με όγκο ψεκ. υγρού 40-82 λίτρα/δεκ. Πλήρης κάλυψη του φυτού όχι μέχρι απορροής. Οι ψεκασμοί ξεκινούν στα πρώτα στάδια εμφάνισης του εντόμου, μέχρι το στάδιο BVCH 89.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: **3 εφαρμογές** ανά 5-15 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Προτείνεται να χρησιμοποιείται με την χαμηλότερη εγκεκριμένη δόση του *Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki (Btk) και του aizawai (Bta).
2. Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε το με μη ιονικό επιφανειοδραστικό (NIS) ή διασπορέα/κόλλα σε αναλογία 0,125% β/β.
3. Οι εφαρμογές να μην γίνονται διαδοχικά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Τομάτα (Υ+Θ): 0 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΙΕΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Κατά τον ψεκασμό εξασφαλίστε ομοιόμορφη κάλυψη ολόκληρου του φυτού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εμπορικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση το *Bacillus thuringiensis* (Bt) στην χαμηλότερη εγκεκριμένη δόση του, το οποίο περιλαμβάνει τα υποείδη aizawai (Bta) και kurstaki (Btk).

SPEAR® LEP

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των προνυμφών του *Tuta absoluta*. Δρα στις προνύμφες λιποδύπτερων μέσω της κατάποσης στις αρχικές φάσεις ανάπτυξής τους και προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα εμπορικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση το *Bacillus thuringiensis* (Bt) στην χαμηλότερη εγκεκριμένη δόση του, το οποίο περιλαμβάνει τα υποείδη aizawai (Bta) και kurstaki (Btk). Καθώς το SPEAR LEP δεν δρα συστηματικά, για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, η προσβεβλημένη φυτική βιομάζα θα πρέπει να ψεκάζεται σχολαστικά. Λειτουργεί κυρίως αναστέλλοντας το κεντρικό νευρικό σύστημα των παρασίτων-στόχων που προσβάλλουν τις εν λόγω καλλιέργειες. Τα συμπτώματα στο έντομο θα φανούν σε 3 μέρες.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

GS-omega/kappa HXTX-Hv1a 20% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: ως 100 % β/β

Πυκνό διάλυμα (SL)



ΠΡΟΣΟΧΗ

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P270** Μην πίνετε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. **P261** Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμού/ εκνεφώματα. **P264** Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.

SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μετακινήστε το παθόντα στον δροσερό αέρα, τοποθετήστε τον σε ημι-όρθια θέση και χαλαρώστε τα ρούχα. Σε περίπτωση δύσπνοιας, παρέχετε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση σημαντικής έκθεσης. Προτείνεται συμπτωματική θεραπεία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό Ανασηκώστε τα βλέφαρα για να εξασφαλίσετε ενδελεχή πλύση. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν είναι γνωστά συμπτώματα ή τυπικές επιδράσεις.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 1401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό χώρο αποφεύγοντας την άμεση έκθεση στον ήλιο και την υψηλή θερμοκρασία. Σε μέρη με υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες πάνω από 30°C μπορεί να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητά του. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C στις προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



**Premier
Shukuroglou**

Premier Shukuroglou Cyprus LTD,
Τηλ. 22815353, Λευκωσία
www.premier.com.cy, contact@premier.com.cy

UFI: A600-80PS-W00T-5C1E

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Vestaron Corporation, ΗΠΑ

VESTARON

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 LT